

La spondylarthrite ankylosante et la polyarthrite rhumatoïde

Une nouvelle approche thérapeutique

Dorin Mindrescu, Mihaela Leucian Orodan

Mots-clés: acupuncture, homéopathie, polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite ankylosante

INTRODUCTION

La spondylarthrite ankylosante est une maladie inflammatoire chronique, progressive, qui est caractérisée par des lésions des articulations sacro-iliaques et intervertébrales. Dans la spondylarthrite ankylosante se produit une augmentation des troubles du système immunitaire marquée par la cytokine pro-inflammatoire TNF alpha et l'IL1.

Cette maladie a une évolution progressive qui accompagne la douleur et la raideur matinale dans la région lombaire.

La maladie débute chez les jeunes 15-20 ans et en particulier chez les hommes.

La polyarthrite rhumatoïde est une maladie auto-immune caractérisée par une destruction progressive des articulations avec des malformations majeures, accompagnées par des pics hyperalgiques répétés, qui conduit finalement à l'incapacité et au décès prématuré.

Dans cette maladie, est affecté le système immunitaire qui produit des anticorps qui attaquent les articulations synoviales causant une inflammation. Lésions synoviales qui conduisent à leur tour à la production de cytokines TNF-alpha et d'interleukine 1, qui va amplifier les destructions irréversibles des articulations.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Chez les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde et de spondylarthrite ankylosante, on a utilisé comme traitement le venin d'abeille injecté par voie intradermique sur les points d'acupuncture.

Le traitement de remplacement a été utilisé en raison de leur traitement spécial de l'injection du venin d'abeille (apitoxina). L'apitoxine stimule l'hypophyse pour sécréter l'ACTH, qui à son tour stimule la glande surrénale pour produire du cortisol et obtenir ainsi un effet analgésique, anti-inflammatoire, ainsi qu'une amélioration la microcirculation. La mélitine agit comme un immunomodulateur en provoquant une diminution de la production de cytokine pro-inflammatoire et une augmentation des cytokines inflammatoires. Le venin d'abeille utilisé par injection était " VENEX20 ".

La deuxième alternative était le traitement homéopathique sous la forme de thérapie moléculaire.

TRAITEMENT

Dans un groupe de patients atteints de spondylarthrite ankylosante et un autre de polyarthrite rhumatoïde a été utilisé le venin d'abeille purifié -VENEX 20 -injection intradermique sur les points d'acupuncture. Chez tous les patients a été effectué le test d'allergie- IgE.

CONCLUSIONS

Ces méthodes alternatives de traitement des maladies chroniques et invalidantes, ont réussi à améliorer les maladies mieux et plus vite que le traitement médical traditionnel classique. L'absence d'effets secondaires peut être un pas en avant pour le traitement de ces maladies.

On a également constaté une diminution du taux de récurrence et un arrêt dans le développement de ces maladies chroniques.

Dorin Mindrescu, MD- orthopédie-traumatologist
Solaris Policlinique-Craiova- Roumanie. E-mail : policlinica.solaris@gmail.com

Mihaela Leucian Orodan MD- medecine d'urgence-Hopital clinique d'urgence
Arad , Roumanie. E-mail: apimedicaapimed@yahoo.com